

DERMATOMIOSITIS




Cutáneo




Miopatía
inflamatoria



EPID (marcador KL-6)
Debilidad
diafragmática



Disfagia
♀ > ♂



Alteraciones de la
conducción

DIAGNÓSTICO:

- Clínica + analítica (CK, aldolasa, PCR y VSG + Ac miositis + ENA)
- Si dudas: biopsia cutánea o RMN muscular +/- biopsia



- 1: Corticoides + HCQ +/- MTX/tacrolimus
- 2: IGs iv (muscular grave)
- 3: RTX (refractarias)



Asociación con
neoplasias
malignas (25%)

CRIBADO

- Citología urinaria
- SOH/colonoscopia
- TC tórax
- Eco abdominal
- Exploración ginecológica

Anti - Mi2



La malignidad es poco común



Cutáneo "clásico"

- Pápulas de Gottron
- Eritema heliotropo
- Signo del chal



Miopatía inflamatoria

predominio de necrosis y
macrófagos



EPID

poco frecuente



Alto porcentaje
de remisión




Anti - MDA5



Mayor incidencia en población asiática




La malignidad es poco común



Cutánea

- Úlceras dolorosas
- Pápulas palmares
- Calcinosis



Hipo/amiotópica



EPID

rápidamente progresiva

Anti-Ro52
peor pronóstico



Artritis erosiva
simétrica y de pequeñas articulaciones

Anti - SAE



Malignidad x4 población general



Clínica más agresiva
(HTPulmonar) y mayor
malignidad en asiáticos



Afectación secuencial:
cutánea primero



Cutáneo


- Eritema difuso pruriginoso
- Pápulas de Gottron y signos del chal



Miopatía inflamatoria leve



EPID “neumonía organizada” pausintomática



Disfagia leve



Artritis y tenosinovitis

Anti – Tif1 γ



Mayor incidencia en población caucásica



Malignidad x10 población general

FR MALIGNIDAD: Varón
+ edad avanzada +
disfagia



- Cutáneo “clásico”
- Psoriasis-like
- Lesiones “rojo sobre blanco”
- Parche palatino ovoide



**Miopatía
inflamatoria**
escasa elevación de CK



Disfagia



Debilidad
diafragmática


Anti – NXP 2

⚠ Malignidad x4 población general



Cutánea


- Calcinosis
- Edema periférico



Miopatía
inflamatoria
atrofia distal precoz



Disfagia



Vasculitis o
vasculopatía
intestinal